Bioatividades de óleos essenciais de espécies do gênero *Baccharis*

Bioactivities of essential oils from species of *Baccharis* genus

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi analisar a bioatividade dos óleos essenciais das folhas dos espécimes feminino (BPF) e masculino (BPM) de *B. punctulata* frente a ensaios antioxidante e citotóxico. Os óleos essenciais foram extraídos por hidrodestilação utilizando *apparatus* Clevenger modificado, verificou-se atividade antioxidante frente ao radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). e a citotóxica frente a *A. salina*. Os compostos majoritários presentes na BPF foram α -acorenol (13,64%), espatulenol (11,81%) e β -pineno (3,29%) enquanto para BPM os compostos majoritários foram espatulenol (23,03%), β -cariofileno (7,76%) e biciclogermacreno (5,44%). A amostra BPF apresentou na concentração de 12,5 mg/mL atividade de 56,96 μ g equivalente ácido ascórbico/mL (EAA/mL), resultando em 26,21% de inibição do radical enquanto que a amostra BPM apresentou na mesma concentração 31,02 μ g EAA/mL equivalente a 14,05% de inibição do radical DPPH, já no ensaio citotóxico frente a *Artemia salina* a amostra BPF apresentou concentração letal (CL₅₀) de 240,80 μ l/ml e a BPM de 63,92 μ l/ml. Conclui-se que os óleos essenciais de ambos espécimes de *B. punctulata* apresentou atividade antioxidante e citotóxica.

PALAVRAS-CHAVE: *B. punctulata*. Óleo essencial. Atividade antioxidante. Atividade citotóxica.

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the bioactivity of essential oils from leaves of the specimens female (BPF) and male (BPM) of the *B. punctulata* front the antioxidants and cytotoxic assays. The essential oils were extracted by hydrodistillation using modified Clevenger *apparatus*, antioxidant activity was evaluated against radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical and cytotoxic activity against *A. salina*. The major compounds for BPF were α -acorenol (13,64%), spatulenol (11,81%) and β -pinene (3,29%) while for BPM the major compounds were spatulenol (23,03%), β -caryophyllene (7,76%) and bicylogermacrene (5,44%). The BPF sample presented at a concentration of 12.5 mg/mL activity of 56.96 μ g equivalent ascorbic acid/mL (EAA/mL), resulting in 26.21% of the radical inhibition while the BPM sample presented at the same concentration 31.02 μ g EAA/mL equivalent the 14.05% inhibition of DPPH radical, in the cytotoxic assay against *Artemia salina* the BPF sample presented a lethal concentration 50 (LC₅₀) of 240.80 μ l/ml and a BPM of 63.92 μ l/ml. It is concluded that essential oils of both *B. punctulata* specimens presented antioxidant and cytotoxic activity.

KEYWORDS: *B. punctulata*. Essential oil. Antioxidant activity. Cytotoxic activity.

Murilo Silva de Oliveira
murilo_tinelli@hotmail.com
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Santa Helena, Paraná, Brasil

Jociani Ascari
jascari@utfpr.edu.br
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Santa Helena, Paraná, Brasil

Recebido: 19 ago. 2019.

Aprovado: 01 out. 2019.

Direito autoral: Este trabalho está licenciado sob os termos da Licença Creative Commons-Atribuição 4.0 Internacional.

1. INTRODUÇÃO

A espécie *Baccharis punctulata* DC. ocorre na América do Sul, no Brasil há registro dessa espécie nos estados das regiões Sul e Sudeste, conhecida popularmente como chirca-do-mato. Relata-se seu uso no tratamento de asma, luxações e contusões na província de Bustillo, Bolívia, entretanto há poucos estudos sobre suas bioatividades (HEIDEN, 2009; SCHOSSLER et al., 2009; FERNANDEZ; SANDI; KOKOSKA, 2003)

Schossler et al. (2009) analisou os óleos essenciais obtidos por hidrodestilação das folhas de *B. punctulata* coletadas em Guaíba-RS, os compostos majoritários presentes no óleo essencial foram o biciclogermacreno (9,73%), cis-cadin-4-en-7-ol (6,77%), Z-ocimeno (6,33%) e limoneno (6%). Minteguiga et al. (2018) analisou os compostos voláteis obtidos de partes aéreas de *B. punctulata* coletadas em Paysandú, Uruguai, com apparatus Likens-Nickerson, observou-se como compostos majoritários o germacreno D-4-ol (7%), β -felandreno (5,20%) e acetato de bornila (5,20%).

Budel et al. (2018) analisou o óleo essencial obtido por hidrodestilação com o apparatus tipo Clevenger das folhas de *B. punctulata* coletadas em Campos Gerais, Ponta Grossa-PR, os compostos majoritários presentes foram espatulenol (9,96%), germacreno D (3,63%) e β -cariofileno (3,35%). Gonzáles (2019) demonstrou em seu estudo a diferenciação química dos óleos essenciais obtidos por hidrodestilação partes aéreas de espécimes feminino e masculino de *B. punctulata* coletadas na Argentina. Como compostos majoritários para o espécime feminino foram observados verbocidentafurano (47,5%), germacra-1(10),5-dien-4 α -ol (7%) e cis-cadin-4-en-7 α -ol (6,3%) e no espécime masculino verbocidentafurano (43,9%), cis-cadin-4-en-7 α -ol (5%) e δ -elemeno (9,1%).

O objetivo deste trabalho é verificar as bioatividades dos óleos essenciais de *B. punctulata*. Desta forma analisou-se os óleos essenciais de espécimes feminino e masculino de *B. punctulata* coletadas na região Oeste do Paraná e verificou-se a citotoxicidade frente a *A. salina* e atividade antioxidante frente ao radical livre DPPH.

2. MÉTODOS

2.1 COLETA E IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL

Ramos de espécimes feminino (BPF) e masculino (BPM) da *B. punctulata* foram coletadas em maio de 2018 na época de floração durante o período da manhã, no município de Santa Helena no Oeste do estado do Paraná. Exsicatas foram confeccionadas e identificadas pelo Dr. Gustavo Heiden e depositados no Herbário ECT da Embrapa Clima Temperado em Pelotas-RS, com a numeração ECT0003431 para BPF e ECT0003425 para a BPM. Tirou-se as folhas dos caules, as quais logo em seguida foram secas na estufa de esterilização com circulação de ar forçada Lucadema Luca-82/480 à 45°C por três dias, posteriormente foram trituradas no moinho de facas Tecnal TE-648 e mantidas no freezer até a data da extração.

2.2 EXTRAÇÕES DOS ÓLEOS ESSENCIAIS E ANÁLISES QUÍMICAS

Os óleos essenciais foram obtidos a partir de 100g de material vegetal por hidrodestilação durante três horas com o uso do apparatus Clevenger. O óleo essencial foi separado do hidrolato utilizando éter etílico, seco com sulfato de

sódio anidro e evaporado no evaporador rotativo Marconi MA120/TH sem vácuo a 45 °C. O rendimento do óleo essencial foi calculado em relação a massa seca do material vegetal. Os óleos essenciais foram submetidos a análises no Cromatógrafo Gasoso Acoplado ao Espectrômetro de Massa e Ionizador de Chamas (CG-EM-DIC) Shimadzu GCMS-QP2010 Plus com coluna não-polar Rtx-5MS (30m x 0,25mm x 0,25µm).

2.3 ENSAIO DE CITOXIDADE COM *A. salina*

Cistos de *A. salina* foram colocados para eclodir em solução de sal marinho na concentração de 38g/L preparada com água destilada por 48 horas atingindo a fase de náuplio, durante esse período foram mantidas sob luz artificial, temperatura de 28 °C e pH entre 8 e 9 (RODRIGUES, 2012). Em média de 10 náuplios foram transferidos para frascos de penicilina com as concentrações dos óleos essenciais, controles negativo e positivo. O experimento foi conduzido sob iluminação constante e após 24 horas verificou-se a mortalidade das larvas de *A. salina* (RODRIGUES, 2012; ADEOGUN; MAROYI; AFOLAYAN, 2018).

As concentrações de óleos essenciais utilizadas no ensaio de citotoxicidade foram de 35 a 1000µg/mL, como controle positivo utilizou-se o lapachol (25 a 150µg/mL) e como controle negativo o DMSO (80 e 200 µg/mL) (RODRIGUES, 2012; ADEOGUN; MAROYI; AFOLAYAN, 2018). O experimento foi realizado em triplicata e os resultados submetidos ao Software GraphPad Prism 6 para os cálculos de CL₅₀.

2.4 ENSAIO ANTIOXIDANTE

As atividades antioxidantes das amostras BPF e BPM foram mensurados frente à captura do radical livre DPPH, o teste foi realizado em triplicata usando a metodologia adotada por Granato et al. (2015) com modificações. Como controle negativo utilizou-se metanol, os resultados foram comparados com uma curva padrão de ácido ascórbico (0,98-14 µg/mL, R²=0,9956) e os resultados foram expressos em µg EAA/mL.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS

Os rendimentos dos óleos essenciais da *B. punctulata* em relação à massa seca foram de 1,55% para o espécime feminino e 1,47% para o masculino, rendimentos esses maiores do que os rendimentos dos óleos essenciais de *B. punctulata* de 85,9% para espécime masculino e 91,8% para o feminino obtidos por Gonzáles (2019).

Os compostos majoritários presentes na BPF foram α-acorenol (13,64%), espatulenol (11,81%) e β-pineno (3,29%) enquanto que a BPM apresentou como compostos majoritário espatulenol (23,03%), β-cariofileno (7,76%) e biciclogermacreno (5,44%). Observou-se que a composição química dos óleos essenciais são diferentes do que há relatado na literatura, e tais diferenças podem estar relacionadas a fatores abióticos e bióticos (GONZÁLES, 2019; NETO; LOPES, 2007).

3.2 ATIVIDADE CITOTÓXICA

Ambas as amostras apresentaram atividade citotóxica frente as *A. salina*. O controle positivo apresentou CL_{50} de 73,04 $\mu\text{l/ml}$ enquanto que a amostra BPF de 240,80 $\mu\text{l/ml}$ e a BPM de 63,92 $\mu\text{l/ml}$.

Danham et al. (2015) verificou a atividade anticâncer do β -cariofileno isolado de óleos essenciais de casca de caules fresco de *Aquilaria crassna* frente a linhagens de células de carcinoma HCT 116, PANC-1, HT-29, ME-180, PC3, K562 e MCF-7, e linhagens de células normais CCD-18, NIH/3T3-L1 e RGC5, o β -cariofileno mostrou-se mais ativo frente as linhagens HCT 116 e PANC-1 e não apresentou atividade significativa frente as células normais.

No trabalho realizado por Costa et al. (2017) verificou-se a atividade antitumoral frente a linhagem de células U251, MCF-7, NCI-ADR/RES, 786-0, NCI-460, OVCAR-3, HT-29, K562 e PC-3 do óleo essencial de folhas de *Nectandra lanceolata* tendo como compostos majoritários bicilogermacreno (18,2%), espatulenol (16,9%) e β -cariofileno (12,5%), o óleo essencial foi ativo frente as linhagens K62, U251 e NCI-460.

Infere-se que a maior atividade citotóxica observada na amostra BPF possa estar relacionada com a alta concentração os compostos majoritários.

3.3 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE

Para o cálculo da atividade antioxidante dos óleos essenciais utilizou-se a padronização com ácido ascórbico frente ao radical DPPH• (Figura 1).

Figura 1- Curva analítica do ácido ascórbico padrão de referência (n = 9) para capacidade antioxidante de sequestro do radical DPPH e seu coeficiente de correlação linear (R^2).

Fonte: Autoria própria

Observou-se que ambas as amostras apresentaram atividade antioxidante frente ao radical DPPH. A amostra BPF apresentou na concentração de 12,5 mg/mL atividade de 56,96 $\mu\text{g EAA/mL}$, resultando em 26,21% de inibição do radical DPPH. Enquanto que a amostra BPM apresentou na mesma concentração 31,02 $\mu\text{g EAA/mL}$ equivalente a 14,05% de inibição do radical DPPH.

Nascimento et al. (2018) verificou a atividade antioxidante frente ao radical DPPH do óleo essencial de *Psidium guineense* tendo como majoritários similares ao da *B. punctulata*, sendo eles espatulenol (80,71%), 2Z,6E-farnesol (3,65%) e 2Z,6Z-farnesol (1,06%) e do espatulenol isolado, o óleo essencial apresentou EC_{50} de 63,08 $\mu\text{g/mL}$ e o espatulenol de 85,60 $\mu\text{g/mL}$.

Daula et al. (2016) estudou a atividade antioxidante frente ao DPPH e ácido 2,2'-azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico (ABTS) do óleo essencial de folhas de *Etilingera fimbriobracteata* tendo com compostos majoritários β -pineno (67,8%), α -pineno (17,8%) e limoneno (2,1%), o óleo essencial apresentou atividade em

ambos ensaios, sendo o EC₅₀ para o DPPH de 518.29 mg/mL enquanto para o ABTS o EC₅₀ foi de 165.46 mg/mL.

Infere-se que a atividade antioxidante de ambas as amostras podem estar relacionadas com compostos majoritários.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio das análises por CG-EM-DIC foi possível verificar diferenças entre na composição química dos óleos essenciais de espécimes feminino e masculino de *B. punctulata*.

Em relação atividade antioxidante ambas as amostras foram ativas e pela primeira vez foi relatado atividade citotóxica dos óleos essenciais de ambos espécimes de *B. punctulata*, sendo os resultados promissores, logo ressalta-se a importância da continuidade dos estudos com essa espécie.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Fundação Araucária pelo o apoio financeiro e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná pelo os laboratórios cedidos para realização dessa pesquisa.

REFERÊNCIAS

ADEOGUN, O. O.; MAROYI, A.; AFOLAYAN, A. J. Comparative evaluation of essential oils from *Lippia javanica* L. leaf obtained by two methods and their effect on *Artemia salina* L. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, v. 17, n. 1, p. 105-115, 2018. Disponível em: < <https://www.ajol.info/index.php/tjpr/article/view/166819> >. Acesso em: 29/Jun./2019.

BUDEL, Jane et al. Essential Oils of Five *Baccharis* Species: Investigations on the Chemical Composition and Biological Activities. Molecules, v. 23, n. 10, p. 2620, 2018. Disponível em: < <https://www.mdpi.com/1420-3049/23/10/2620> >. Acesso em: 29/Jun./2019.

COSTA, E. R. et al. Chemical composition, antitumoral and antibacterial activities of essential oils from leaves and stem bark of *Nectandra lanceolata* (Lauraceae). Journal of Essential Oil Bearing Plants, v. 20, n. 5, p. 1184-1195, 2017. Disponível em: < <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0972060X.2017.1394223> >. Acesso em: 29/Jun./2019.

DAHAM, S. et al. The anticancer, antioxidant and antimicrobial properties of the sesquiterpene β -caryophyllene from the essential oil of *Aquilaria crassna*. Molecules, v. 20, n. 7, p. 11808-11829, 2015. Disponível em: < <https://www.mdpi.com/1420-3049/20/7/11808/htm> >. Acesso em: 29/Jun./2019.

FERNANDEZ, E. C.; SANDI, Y. E.; KOKOSKA, L. Ethnobotanical inventory of medicinal plants used in the Bustillo Province of the Potosi Department, Bolivia. Fitoterapia, v. 74, n. 4, p. 407-416, 2003. Disponível em: <

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X03000534> >. Acesso em: : 29/Jun./2019.

GONZÁLEZ, M. D. Chemical composition of the leaf oil from *Baccharis punctulata* DC. at two phenological stages. *Journal of Essential Oil Research*, p. 1-9, 2019. Disponível em: < <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10412905.2019.1612472>>. Acesso em: 29/Jun./2019.

GRANATO, D. et al. Authentication of geographical origin and crop system of grape juices by phenolic compounds and antioxidant activity using chemometrics. *Journal of food science*, v. 80, n. 3, p. C584-C593, 2015. Disponível em: < <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1750-3841.12794> >. Acesso em: 29/Jun./2019.

MINTEGUIAGA, M.; GONZÁLEZ, A.; CASSEL, E.; et al. Volatile Constituents from *Baccharis* spp. L. (Asteraceae): Chemical Support for the Conservation of Threatened Species in Uruguay. *Chemistry and Biodiversity*, v. 15, n. 5, 2018. Disponível em: < <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cbdv.201800017> >. Acesso em: 29/Jun./2019.

DO NASCIMENTO, K. F. et al. Antioxidant, anti-inflammatory, antiproliferative and antimycobacterial activities of the essential oil of *Psidium guineense* Sw. and *spathulenol*. *Journal of ethnopharmacology*, v. 210, p. 351-358, 2018. Disponível em: < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874117317476> >. Acesso em: 29/Jun./2019.

NETO, L. G.; LOPES, N. P. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de metabólitos secundários. *Química nova*, v. 30, n. 2, p. 374, 2007. Disponível em: < <http://www.quimicanova.sbg.org.br/> >. Acesso em: : 29/Jun./2019.

SCHOSSLER, P. et al. Volatile compounds of *Baccharis punctulata*, *Baccharis dracunculifolia* and *Eupatorium laevigatum* obtained using solid phase microextraction and hydrodistillation. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, v. 20, n. 2, p. 277-287, 2009. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-50532009000200012&script=sci_arttext&tlng=pt >. Acesso em: : 29/Jun./2019.

RODRIGUES, V. G. et al. Evaluation of antimicrobial activity and toxic potential of extracts and triterpenes isolated from *Maytenus imbricata*. *Química Nova*, v. 35, n. 7, p. 1375-1380, 2012. Disponível em: < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874117317476> >. Acesso em: 29/Jun./2019.

UD-DAULA, A. F. M. S. et al. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of essential oils from leaves, aerial stems, basal stems, and rhizomes of *Etilingera fimbriobracteata* (K. Schum.) RM Sm. *Industrial Crops and products*, v. 84, p. 189-198, 2016. Disponível em < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669015306208> >. Acesso em: 29/Jun./2019.